

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP26-2-74253814

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55 Rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.

55, Rue Mazenod - 69 - LYON-3°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 3 (nouvelle série)

21 février 1974.

V I G N E

Excoriose-Esca -

L'excoriose marque cette année une régression assez sensible dans la région, aussi sera-t-il opportun de n'effectuer de traitement spécifique que dans les régions où la maladie a été repérée de façon certaine : les décolorations de l'écorce ne sont pas toutes dues à l'excoriose et l'on peut confirmer sa présence seulement par l'observation de nombreuses ponctuations noires sur ce fond clair et du renflement à la base des sarments les plus atteints, sarments qui deviennent très fragiles à leur empattement.

Une solution d'arsénite de soude contenant 625 g/hl d'arsenic pur sera alors appliquée assez longtemps après la taille mais avant tout départ de la végétation.

Contre l'esca (apoplexie) qui sévit encore localement dans la région, on utilisera la même formule mais à dose double.

ARBRES FRUITIERS

Monilia de l'abricotier -

En raison de l'avance simultanée de la végétation et de l'évolution de la maladie, on appliquera dès que les conditions seront favorables un premier traitement à l'aide d'une des formules suivantes :

- Bénomyl (Benlate) à 30 g/hl de matière active
- Folpel (13 marques commerciales) à 100 g/hl de m.a.
- Méthylthiophanate (Pelt 44) à 70 g/hl de m.a.
- Mancozèbe (Dithane M 45 ou Sandozèbe) à 160 g/hl de m. a.
- Thiabendazole (Tecto 60) à 100 g/hl de m.a.
- Thirame ou T M T D (13 marques commerciales) à 200 g m.a.
- Carbatène (Trionèbe ou Organil) à 200 g/hl de m.a.

Tavelure du poirier -

Dans la plupart des vergers, les pustules sur rameaux sont pratiquement absentes, de sorte que le premier traitement dirigé ordinairement au stade C3 contre les Conidies ne sera appliqué que dans la mesure où la présence de ces pustules sur les parties de rameaux restant après la taille aura été dûment constatée. Il est évident que cette restriction ne sera valable que si les bois de taille ont été éliminés du verger.

Puceron vert du pêcher -

Le traitement pourra être appliqué jusqu'à l'ouverture des premières fleurs. Actuellement il ne peut être effectué qu'à l'aide d'un aphicide (de préférence non phosphoré) tel : Dioxacarbe, Endosulfan, Isolane, Lindane, Méthomyl, Pirimicarbe, etc...

GRANDE CULTURE

Charançon de la tige du colza

La prochaine période de beau temps au cours de laquelle la température dépassera 14° sera favorable à l'activité de l'insecte et par conséquent à l'application du traitement.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé
des Avertissements Agricoles,

L'Ingénieur en chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription,

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Directeur gérant : LBOUÏX

A. PITHIQUOT

7181